

## ZOOM SUR LE « LEAKY GUT »


### QU'EST-CE QUE LE LEAKY GUT ?

L'intestin est tapissé de millions de cellules reliées entre elles par des jonctions serrées. Ensemble, elles forment une barrière sélective qui permet le passage des nutriments tout en bloquant les substances indésirables. Cependant, cette barrière peut se fragiliser et devenir trop perméable sous l'effet de divers facteurs :

- Stress
- Travail intense
- Inflammation
- Déséquilibre du microbiote
- Alimentation inadaptée


Dans ce cas, l'intestin laisse passer des toxines, allergènes ou microbes vers la circulation sanguine : c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale, ou "leaky gut".

### LES 3 ACTEURS PRINCIPAUX DE L'ÉCOSYSTÈME INTESTINAL



#### LE MICROBIOTE

Il participe à la digestion, protège l'organisme contre les bactéries « ennemies » et contribue au renforcement du système immunitaire.



#### L'ÉPITHÉLIUM INTESTINAL

Il tapisse la paroi du tube digestif et constitue une très grande surface d'échanges.



#### LE SYSTÈME IMMUNITAIRE INTESTINAL

Il assure la défense de l'organisme face aux agents pathogènes.

# GUT DIGEST

LAMBEY SAS • MOULIN DES PRÉS • F-71270 TORPES  
Tél. +33 (0)3 85 72 31 65 • [lambey@lambey.fr](mailto:lambey@lambey.fr) • [WWW.LAMBEY.COM](http://WWW.LAMBEY.COM)

\* BÉNÉFICES  
SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉS



# GUT DIGEST

GAMME HEALTH

CHEVAUX SUJETS À UNE  
**HYPERSENSIBILITÉ INTESTINALE**  
OU « LEAKY GUT »

Aliment granulé hautement concentré en principes actifs  
**SANS CÉRÉALES ENTÈRES**



# Lambey

# GUT DIGEST

GAMME HEALTH

DENSITÉ 1 L = 650 G

## UTILISATION

Se distribue à raison de 2 à 6 kg par jour en complément du fourrage.

Aliment complémentaire destiné à l'alimentation des chevaux.

- Distribuer au minimum 1.2 kg de foin pour 100 kg de poids vif pour des chevaux sur litière paille et 1.5 kg par 100 kg de poids vif pour des chevaux sur litière copeaux.

- Laisser une pierre à sel à disposition en libre-service et de l'eau propre à volonté.

- Dans l'idéal, fractionner la ration en minimum 3 repas équilibrés.

Les quantités distribuées sont à ajuster en fonction du poids, de l'état corporel, de l'âge, de l'activité, de la race du cheval, ainsi qu'en fonction de la nature, des quantités et de la qualité du fourrage distribué.

## COMPOSITION

Luzerne déshydratée, Son de blé, Pulpe de betterave séchée, Graines de lin cuites extrudées, Huile de colza, Pulpe de chicorée séchée, Marc de pomme séché, Argiles, Fructo-oligosaccharides, Sel, Phosphate bicalcique, Racines de chicorée, Germes de blé, Protéines d'origine unicellulaire d'Aspergillus oryzae.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AU KG BRUT

|                        |      |
|------------------------|------|
| Calcium                | 17 g |
| Phosphore              | 6 g  |
| Magnésium              | 3 g  |
| Potassium              | 13 g |
| Mat. azotée digestible | 78 g |
| Oméga 3                | 15 g |
| Oméga 6                | 17 g |

## ACIDES AMINÉS AU KG BRUT

|        |       |
|--------|-------|
| Lysine | 5,0 g |
|--------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Methionine + cystine | 3,7 g |
| Methionine           | 1,9 g |
| Thréonine            | 4,1 g |
| Tryptophane          | 1,8 g |
| Leucine              | 7,5 g |
| Arginine             | 6,4 g |
| Isoleucine           | 4,5 g |
| Valine               | 5,8 g |
| Phénylalanine        | 5,0 g |

## CONSTITUANTS ANALYTIQUES

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Protéine brute            | 11,5 % |
| Cellulose brute           | 15 %   |
| Matières grasses brutes   | 7,5 %  |
| Matières minérales brutes | 14,0 % |
| Sodium                    | 0,41 % |
| Amidon                    | 4,4 %  |
| Sucres totaux             | 3,9 %  |

## VITAMINES ET OLIGO ÉLÉMENTS AU KG BRUT

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Vitamine A          | 20 700 .U.I |
| Vitamine D3         | 3 450 .U.I  |
| Vitamine E          | 840 mg      |
| Vitamine B1         | 15 mg       |
| Vitamine B2         | 11 mg       |
| Vitamine B6         | 11 mg       |
| Vitamine B12        | 0,03 mg     |
| Vitamine PP         | 27 mg       |
| Vitamine C          | 820 mg      |
| Vitamine K3         | 1,2 mg      |
| Acide pantothénique | 9,0 mg      |
| Acide folique       | 0,7 mg      |
| Chlorure de choline | 276 mg      |
| Biotine             | 5,6 mg      |
| Fer.                | 152 mg      |
| Cuivre              | 48 mg       |
| Zinc                | 193 mg      |
| Manganèse           | 138 mg      |
| Iode                | 2,0 mg      |
| Cobalt              | 0,62 mg     |
| Sélénium total      | 1,11 mg     |



## PRÉSERVE LES MUQUEUSES GASTRIQUES\*

Une combinaison d'ingrédients spécifiques jouent un rôle de pansement digestif.




## MAINTIEN L'INTÉGRITÉ DE LA MUQUEUSE INTESTINALE

La vitamine A et le zinc contribuent au maintien de muqueuses intestinales normales.




## SOUTIEN INTESTINAL



## SOUTIEN LA BARRIÈRE INTESTINALE

La glutamine, un acide aminé, et Aspergillus oryzae, un prébiotique, sont deux ingrédients dont les effets sur l'intégrité de la barrière intestinale sont scientifiquement démontrés. Ils contribuent à prévenir l'augmentation de la perméabilité intestinale observée lors d'un exercice physique modéré à intense ou en situation de transport.



## ÉQUILIBRE LE MICROBIOTE INTESTINAL\*

L'apport d'un complexe actif favorise la digestion des fibres de la ration, stabilise l'acidité du gros intestin et améliore son fonctionnement.

\* Impact of Low-Starch Dietary Modifications on Faecal Microbiota Composition and Gastric Disease Scores in Performance Horses, J. Irving, V. Pineau, S. Shultz, F. ter Woort, F. Julien, S. Lambey, E. van Erck-Westergren, 2025, Animals.

\* Improvement of gastric ulcer and ridden horse pain ethogram scores with diet adaptation in sport horses, V. Pineau, F. ter Woort, F. Julien, M. Vernant, S. Lambey, E. van Erck-Westergren, 2023, ECVSMR.

\* Diet induced changes in gastric and faecal microbiota in horses: association with gastric ulcer healing, E. van Erck, Westergren and F. ter Woort, 2019, BEVA.

